

LAS RANAS DE LICINDO

LICINDO TEBEZ
PARAJE
"EL HACHA"





Licindo Tebez nació en el paraje "Los choros", Misión Nueva Pompeya Chaco. Actualmente vive junto a su esposa y sus 3 hijos en el paraje "El Hacha".

Su padre fue un mariscador (cazador) que vivió de la caza furtiva para poder dar de comer y vestir a su familia. Licindo se crió en contacto con el monte chaqueño donde aprendió los labores de la tierra y a usar los recursos que le brindaba el chaco semiárido.

Su primer contacto con investigadores fue en el año 2008. Desde ese entonces comenzó a cambiar su visión de "uso" del monte chaqueño. En el año 2011 conoce a la doctora Micaela Camino que lo invita a formar parte del monitoreo participativo de animales de monte. Así aprendió a usar herramientas para la toma de datos con carácter científico, transformándose en uno de los participantes locales más activos e interesados estudiar la fauna. Además, comenzó a participar en educación ambiental creando su propia charla sobre su visión del uso sustentable del monte chaqueño, donde cuenta cómo "cambió la escopeta 22 por la cámara de fotografía." Licindo siempre fue un autodidacta de la vida, adaptándose a vivir en el chaco semiárido.

Este material surge de su iniciativa de usar las herramientas de monitoreo y poner en práctica los conocimientos adquiridos con el Proyecto Quimilero durante mas de 2 años, obteniendo fotografías y datos sobre la ecología de las ranas que habitan cerca de su casa. Su inquietud y amor por brindar su conocimiento hoy nos ofrece este material único con conocimientos locales sobre las ranas de una porción del chaco semiárido.

PRESENTACIÓN

Este material educativo se hizo dentro del marco del Proyecto Quimilero como una forma de valorar el conocimiento de la gente habitante del Impenetrable. Licindo Tebez tuvo la iniciativa de estudiar y fotografiar ranas, sapos y escuerzos que habitan en la zona. A través de su experiencia y capacidad de observación, Licindo ha adquirido gran conocimiento de la ecología y comportamiento de estos animales. La información que se presenta en este libro es en su mayoría escrita por Licindo.

Dos expertos en estas especies, Eduardo F. Schaefer y Ezequiel Pintos, colaboraron en corroborar la información y además agregaron algunos datos importantes.

Hugo Correa y Mariana Altrichter ayudaron a recolectar la información, trabajaron con Licindo en el diseño del material e hicieron este proyecto posible.

La mayoría de las fotos las sacó Licindo. Peter Sherman y Ezequiel Pintos contribuyeron con algunas de las fotos.

Fondos del Proyecto Quimilero, a cargo de la doctora Micaela Camino, se destinaron para la impresión del libro.

© Licindo Tebez, 2018

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.



Familia: CERATOPHYDAE

Nombre local: Escuerzo verde

Nombre común: Sapo chaqueño

Nombre científico: *Lepidobatrachus laevis*
(Budgett, 1899)



Come todo tipo de animales que pasen cerca y entren en su boca, como otras ranas, peces, incluso, los más grandes puede comer patitos y pollitos. Hay pocos por charco.

Se lo ve en verano en tiempo de lluvias, en los charcos, lagunas y otros cuerpos de agua. No se aleja del agua. Cuando se secan las fuentes de agua los escuerzos se entierran, hasta 1 metro de profundidad y permanecen enterrados hasta la próxima lluvia torrencial que llene los charcos.



Foto E. Flores

La coloración varía



Es agresivo si se lo molesta. Puede morder para defenderse pero su mordedura no es peligrosa, y tampoco venenosa.

Es más grande que la rana verde, con brazos y piernas cortos, y el cuerpo ancho.

Familia: CERATOPHYDAE

Nombre local: Escuerzo

Nombre común: Escuerzo

Nombre científico: *Lepidobatrachus llanensis* (Reig and Cei, 1963)



El lomo es de color marrón con manchas amarillas.

Se los encuentra en los fondos de charcos con agua cristalina.

Se los ve poco en épocas que no llueve. En la época seca se entierran en los charcos.

Familia: CERATOPHYRIDAE

Nombre local: Escuerzo negro y amarillo

Nombre común: Escuerzo chaqueño

Nombre científico: *Ceratophrys cranwelli* (Barrio, 1980)



Aparece con las primeras lluvias de verano. Hace como un silbido. Come animalitos, otras ranas, e insectos. También come escuerzos más pequeños. Es menos agresivo que el escuerzo verde. Se esconde en la hojarasca. Es más temestre que el escuerzo verde, sin embargo necesita agua para reproducirse.



Es endémico del
Gran Chaco



Familia: HYLIDAE

Nombre local: Cor

Nombre común: Rana mono vientre manchado chaqueño

Nombre científico : *Phyllomedusa sauvagii* (Boulenger, 1882)



La coloración varía



Llama la atención por su canto fuerte que suena como cor cor cor. Canta durante los meses de primavera y verano y antes de un cambio de clima. El resto del año no se ve tanto y está callada. Vive en árboles, como el vinal y otros. Pasa todo el día en las ramas, de noche baja a comer y se acerca a los charcos.

Puede cazar desde el árbol. Come insectos de todos tamaños. Son solitarias en los árboles. En charcos se pueden encontrar varias cantando juntas desde los árboles y arbustos donde construyen sus nidos con hojas.



Es caminadora y es raro verla saltando

Familia: HYLIDAE

Nombre local: Rana ojorosa

Nombre común: Rana trepadora hocicuda

Nombre científico: *Scinax nasicus* (Cope, 1862)



Sale en tiempos de lluvia en el verano. Se pueden encontrar muchas en un mismo árbol, cerca de los cuerpos de agua. Comen insectos.



Se sube a los árboles y arbustos.

Familia: HYLIDAE

Nombre local: Rana amarilla crema

Nombre común: Rana trepadora chaqueña

Nombre científico: *Boana raniceps* (Cope, 1862)

Hay más en el verano pero se la ve el resto del año cuando hace calor. Canta en el verano. Se la ve en las casas, en el monte, cerca del agua. Se la ve en árboles, en horquetas. Canta diferente a la rana verde.

La coloración varía.



Familia: HYLIDAE

Nombre local: Rana de la tinaja

Nombre común : Rana trepadora hocicuda chaqueña

Nombre científico: *Scinax acuminatus* (Cope, 1862)

Parece doméstica, está mucho en las casas, en las macetas, tinajas y otros lugares donde hay humedad. También anda en charcos pero siempre busca la sombra, lugares frescos y húmedos. Se la ve en las casas, cuando hay vasijas mojadas.

Canta y se la ve en el verano y también sale el resto del año cuando hace calor.

Come bichitos chiquitos.



Familia: HYUDAE

Nombre local: Rana del Guayacan

Nombre común: Rana ternero o lechosa

Nombre científico: *Trachycephalus typhanius* (Linnaeus, 1758)

Se la ve en la época de lluvias en los charcos donde gritan en forma de coro. El resto del tiempo está escondida en los árboles en huecos y ranuras, y otros lugares oscuros.

Se escucha cuando se dejan caer de los árboles al piso. Caen en la tierra y van al agua donde se aparean y vuelven a los árboles. En la piel tiene como una baba que es blanca e irritante.

Se la llama rana ternero porque su canto es similar al sonido que emiten los terneros.



Familia:
LEPTODACTYLIDAE

Nombre local: Rana del bañado

Nombre comun: Rana coralina

Nombre científico: *Leptodactylus laticeps* (Boulenger, 1918)



Come animales, incluso pequeñas serpientes y también individuos de su propia especie.

Es una especie VULNERABLE endémica del Chaco Semárido. No es agresiva. Es necesario protegerla. El Chaco Semárido es el único lugar en el planeta en el que vive.

Se la ve todo el año cuando hace calor y antes de un cambio de tiempo. Cuando llueve mucho gritan, aunque sea invierno. Andan más en otoño-invierno. Se los escucha en el monte si llueve, lejos de cuerpos de agua. Se la ve más fuera del agua que dentro. La gente le tiene miedo porque tiene color como víbora de coral y creen que les salta encima y les muerde pero no es peligrosa.



Viven en vizcacheras, resumideros, caños y debajo de raíces.

Familia: LEPTODACTYLIDAE

Nombre local: Ranita de la vizcachera

Nombre común: Rana silbadora

Nombre científico: *Leptodactylus bufonius* (Boulenger, 1894)



Durante el día se guardan en las cuevas, y salen al atardecer. Se la ve más en la tierra que en el agua.

Se la ve todo el año cuando hay humedad y calor. Come insectos.



Se alejan de los charcos y se meten en las cuevas de las vizcachas.

Familia: LEPTODACTYLIDAE

Nombre local: Rana Llorona

Nombre común: Ranita cuatro ojos

Nombre científico: *Phyllsalaemus biligonigerus* (Cope, 1861)

Se la ve en verano. Apenas llueve ella grita. Muchas gritan al mismo tiempo, suena como un auto de fórmula uno. Tiene un color crema rosado.



Parece que migra de pozo en pozo, se la ve caminando en la tierra. Cuando uno se acerca se aplasta.



Culebra negra de agua comiendo un ejemplar adulto.



Familia: LEPTODACTYLIDAE

Nombre local: Rana saltadora

Nombre común: Rana chaqueña

Nombre científico: *Leptodactylus chaquensis* (Cel, 1950)



Come insectos. A veces se comen entre ellas. Salta, no camina. Se esconde en los chaguarales o debajo de palos caídos.

Se la ve en el verano, en las orillas de los charcos, y durante el resto del año cuando hace calor aunque no llueva.



Se le ven los ojos rojos en las fotos con flash.

Familia: MICROHYLIDAE

Nombre local: Escuerzo lomo verdoso

Nombre común: Rana Muller Chaqueña

Nombre científico : *Dermatonotus muelleri* (Boettger, 1885)



Foto: C. Pizarro

Se la encuentra en la tierra, caminando.
Es común. Sale cuando llueve.

Su cuerpo rechoncho hace que se la confunda con un escuerzo pero es una rana. Se trata de una rana especialista en comer solo homigas y temitas.



Familia: CERATOPHYIDAE

Nombre local: Escuerzo blanco y negro

Nombre común: Escuercito chaqueño

Nombre científico: *Chacophrys pierottii* (Vellard, 1948)



A veces en el verano cuando llueve se lo ve en gran cantidad en zonas abiertas como en las calles.

Come animalitos, como otras ranas, pajarillos, y también se comen entre ellos.



Es más chico que el escuerzo verde.

Familia: BUFONIDE

Nombre local: Sapito aspero

Nombre común: Sapito granuloso chaqueño

Nombre científico: *Rhinella major* (Müller and Hellmich, 1936)



Se lo ve en el verano y muy poco en el invierno. Si llueve sale de día. Come insectos. Se arrima a la luz y al fuego. No vive en el agua. También se mete en las casas.

Se lo ve en tiempos de lluvia. Es más chico que otros sapos. Canta en el verano cuando recién llueve. Camina a la orilla de los charcos. Come insectos.



Familia: BUFONIDAE

Nombre local: Sapo rococo chico

Nombre común: Sapo cururu

Nombre científico: *Rhinella diptycha* (Cope, 1862)



En la zona se lo llama rococo chico, porque la gente piensa que es otra especie, porque están acostumbrados a verlo cuando es joven y sus manchas son más claras y marcadas. Cuando se hace adulto esas manchas se oscurecen.

Se lo ve en el verano y muy poco en el invierno. Si llueve sale de día. Come insectos. Se anima a la luz, y al fuego. No vive en el agua. También se mete en las casas.



Rococo juvenil con manchas bien definidas y banda vertebral clara.